

Cultures Frandes

Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE 10 rue du seminaire 94516 RUNGIS cedex Tél: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gerant J. BOULUD

Publication periodique C.P.P.A.P n°0904 B 00536 ISSN n°0767-5542

Tarif Courner 360 F Fax 435 F

AVERTISSEMENTS

PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 21 du 21 juin 2000 - 2 pages Numéro ordre postal : 40

Pois

STADES: gousses pleines 1er à 3ème étage.

Ravageurs

Le vol de tordeuse se poursuit mais n'atteint pas des niveaux très élevés comme on peut en trouver en Champagne. Les cumuls les plus fréquents sont de l'ordre de 70 à 100 tordeuses, et les maximum dans les mêmes secteurs que la semaine dernière atteignent 200 à 250 captures.

Le seuil de 400 captures cumulées au stade gousses pleines du 2ème étage n'est pas atteint dans la région. Une intervention spécifique contre ce ravageur n'est pas utile sur les pois destinés à l'alimentation animale.

Pour des pois destinés à la semence, une intervention peut être envisagée dans tous les secteurs où les cumuls dépassent 50, si le dernier insecticide (pyrèthre) remonte à plus de 15 jours.

Maladies

Peu d'évolution de l'anthracnose, le plus souvent présente sur les étages foliaires inférieurs au 1er étage de gousses. Le niveau de botrytis est faible. La rouille n'a guère progressé depuis la semaine dernière.

Hormis un retour durable de conditions humides, la situation maladie est certainement stabilisée, et les traitements fongicides ne sont plus opportuns.

Maïs

STADES: 8 à 12 feuilles

Ravageurs

Les infestations pucerons sont toujours très faibles.

Le vol de pyrale est désormais en cours dans de nombreux secteurs (voir carte).

Les premières pontes ont été observées dans le centre Seine et Marne, là où le vol a débuté début juin (Crisenoy). Les traitements dervront y être réalisésen tout début de semaine prochaine.

30.

Pour les autres secteurs, les traitements devront être positionnés en fin de semaine prochaine pour le sud Seine et Marne et le sud-est de l'Essonne, et début juillet ailleurs A confirmer dans les prochains bulletins. La décision d'intervention ou non à la parcelle peut se faire par un contrôle des pontes. Au delà de 10 pontes pour 100 pieds, le traitement est conseillé.

Betteraves

Maladies

Les taches observées ici où là sur le feuillage depuis 2-3 semaines, sont du pseudomonas (bactérie se développant sur des blessures) et non de la cercosporiose.

Pas d'intervention fongicide.

Colza

Maladies

Les notations sclérotinia que nous réalisons donnent des niveaux d'attaque de 10 à 40% de pieds touchés dans les témoins non traités. Si vous observez de tels niveaux sur vos parcelles protégées, il faut envisager peut être un problème d'efficacité du traitement (résistance ou autre).




Pois Des tordeuses mais sans plus.

Maïs Situation pyrale.



0

CAPTURES CUMULEES DE TORDEUSES AU 20 / 6



CAPTURES CUMULEES DE PYRALE AU 20 / 6

